

# Cuestionario de Función Pulmonar

IDNUM:

Entrevistadora:

Cuando se haga una cita asegúrese de que los padres entiendan que los niños que toman medicamentos de forma regular, no deben tomarlo durante al menos 4-8 horas antes de la prueba de función pulmonar. Antes de comenzar el cuestionario realizar la siguiente pregunta:

**¿Ha utilizado un inhalador (polvorizado) en la última hora?**

Sí \_\_\_ No \_\_\_

Si se responde sí a esta pregunta, retrasar la prueba de función pulmonar hasta una hora después del uso del inhalador para inhaladores de acción corta y hasta 4 horas si los niños han utilizado inhaladores de acción larga como los agonistas-beta2 y anti-muscarínicos. **(ver listado de medicamentos más frecuentes al final de la hoja)**

**1. ¿Estás resfriado en este momento?**

Sí \_\_\_ No \_\_\_

**2. ¿Ha tenido una infección respiratoria en las últimas 3 semanas?**

Sí \_\_\_  **4.1 ¿cuántos días hace que terminó?** \_\_\_ días

No \_\_\_

**3. ¿Has tenido un ataque de asma en los últimos 3 días?**

Sí \_\_\_ No \_\_\_

**4. ¿Has tomado alguna medicación para el asma en las últimas 24 horas (incluyendo inhaladores, aerosoles o pastillas)?**

Sí \_\_\_ No \_\_\_

**5. ¿Ha usado un inhalador en las últimas 24 horas?**

Sí \_\_\_ (Ir a la pregunta 5.1)

No \_\_\_

 **5.1 ¿Ha usado un inhalador beta2-agonista o un inhalador anti-muscarínico en las últimas 4 horas?**

Sí \_\_\_ (considerar esperar 4 horas tras la toma, si no es posible, proceder).

No \_\_\_

**6. ¿Has usado algún otro medicamento (incluyendo pastillas, capsulas o supositorios) para ayudarte a respirar u otro anti-muscarínico en las últimas 24 horas?**

Sí \_\_\_ (Continuar en la pregunta 6.1)

No \_\_\_ (Fin del cuestionario)

**6.1 ¿Qué medicamentos has tomado y hace cuántas horas que los tomaste?**

---

---

---

## MEDICAMENTOS INHALADOS DE USO MÁS FRECUENTE (se indica principio activo y nombres comerciales)

**1. Inhaladores acción corta (no tomar al menos 1 h antes de la prueba):**

- Salbutamol: *Ventolín, Butoasma, Ventilastín, Butosol, Ventoaldo.*
- Terbutalina: *Terbasmin.*
- Bromuro de Ipratropio: *Atrovent.*

**2. Inhaladores acción larga (no tomar al menos 4-8 h antes de la prueba):**

- Salmeterol: *Beglam, Betamicon, Inaspir, Serevent.*
- Salmeterol + fluticasona: *Anasma, Inoladio, Plusvent, Seretide.*
- Formeterol: *Oxis, Foradil, Broncaral, Neblic.*
- Formeterol + budesonida: *Symbicort, Rilast.*